

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ" ПО МАТЕМАТИКЕ

11 класс

ВАРИАНТ 6

ШИФР

Бланк задания должен быть вложен в работу.
Работы без вложенного задания не проверяются.

1. [3 балла] Найдите количество восьмизначных чисел, произведение цифр каждого из которых равно 16875. Ответ необходимо представить в виде целого числа.

2. [5 баллов] Решите уравнение $\cos 7x + \cos 3x - \sqrt{2} \cos 10x = \sin 7x + \sin 3x$.

3. [5 баллов] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \left(\frac{x^4}{y^2}\right)^{\lg y} = (-x)^{\lg(-xy)}, \\ 2y^2 - xy - x^2 - 4x - 8y = 0. \end{cases}$$

4. [5 баллов] Сфера с центром O вписана в трёхгранный угол с вершиной S и касается его граней в точках K, L, M (все плоские углы трёхгранного угла различны). Найдите угол KSO и площадь сечения данного трёхгранного угла плоскостью KLM , если известно, что площади сечений трёхгранного угла плоскостями, касающимися сферы и перпендикулярными прямой SO , равны 4 и 9.

5. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , при которых система

$$\begin{cases} |x - 6 - y| + |x - 6 + y| = 12, \\ (|x| - 6)^2 + (|y| - 8)^2 = a \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

6. [6 баллов] а) Две окружности одинакового радиуса 13 пересекаются в точках A и B . На первой окружности выбрана точка C , а на второй – точка D . Оказалось, что точка B лежит на отрезке CD , а $\angle CAD = 90^\circ$. На перпендикуляре к CD , проходящем через точку B , выбрана точка F так, что $BF = BD$ (точки A и F расположены по разные стороны от прямой CD). Найдите длину отрезка CF .

б) Пусть дополнительно известно, что $BC = 10$. Найдите площадь треугольника ACF .

7. [6 баллов] Найдите количество пар целых чисел (x, y) , удовлетворяющих системе неравенств

$$\begin{cases} y \geq 3^x + 4 \cdot 3^{81} \\ y < 85 + (3^{81} - 1)x \end{cases}$$

Ответ должен быть представлен в виде алгебраической суммы не более двух слагаемых.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Задача 1

Разложение числа 16875 на простые множители:

$$16875 = 5^4 \cdot 3^3$$

Значит есть всего 2 набора цифр, для представления числа из условия.

Набор 1: четыре 5; три 3; одна 1

Набор 2: четыре 5; одна 9; одна 3; ^{две}одна 1

$$\text{Кол-во чисел из набора 1} = \frac{8!}{4! \cdot 3!}$$

$$\begin{aligned} \text{Кол-во чисел из набора 2} &= \frac{8!}{4! \cdot 2!} \\ &= \frac{8!}{4! \cdot 2!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Сумма} &= \frac{8!}{4! \cdot 2!} + \frac{8!}{4! \cdot 3!} = 8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 + 8 \cdot 7 \cdot 5 = 8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 4 = \\ &= 56 \cdot 20 = 1120 \end{aligned}$$

Ответ: 1120

Задача 2

$$\cos 7x + \cos 3x - \sqrt{2} \cos 10x = \sin 7x + \sin 3x$$

$$2 \cos\left(\frac{7x+3x}{2}\right) \cos\left(\frac{7x-3x}{2}\right) - 2 \sin\left(\frac{7x+3x}{2}\right) \cos\left(\frac{7x-3x}{2}\right) = \sqrt{2} \cos 10x$$

$$2 \cos 2x (\cos 5x - \sin 5x) = \sqrt{2} (\cos^2 5x - \sin^2 5x)$$

$$(\cos 5x - \sin 5x) (\sqrt{2} \cos 2x - (\sin 5x + \cos 5x)) = 0$$

$$\sin 5x + \cos 5x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin 5x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 5x \right) = \sqrt{2} \cos \left(5x - \frac{\pi}{4} \right)$$

Аналогично:

$$\sin 5x - \cos 5x = \sqrt{2} \cos \left(5x + \frac{\pi}{4} \right)$$

свер.
ср.

$$\sqrt{2} \cos(5x + \frac{\pi}{4}) (\sqrt{2} \cos 2x - \sqrt{2} \cos(5x - \frac{\pi}{4})) = 0$$

$$\begin{cases} \cos(5x + \frac{\pi}{4}) = 0 \\ \cos 2x = \cos(5x - \frac{\pi}{4}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \pi k \\ 2x = 5x - \frac{\pi}{4} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z} \\ 2x = \frac{\pi}{4} - 5x + 2\pi k \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{20} + \frac{\pi k}{5} \\ x = \frac{\pi}{20} + \frac{2\pi k}{3} \\ x = \frac{\pi}{28} + \frac{2\pi k}{7} \end{cases}$$

Ответ.

(т.к. $k \in \mathbb{Z}$
+ $2\pi k$
эквивалентно
- $2\pi k$ с точки
зрения рассмо-
трения всех
решений)

Задача 3

$$I \int \left(\frac{x^4}{y^2}\right)^{\lg y} = (-x)^{\lg(-xy)}$$

$$II \int 2y^2 - xy - x^2 - 4x - 8y = 0$$

Решим ур-е $\frac{\pi}{y}$
относительно y

$$\begin{aligned} 2y^2 - y(x+8) - (x^2+4x) &= 0 \\ D &= x^2 + 16x + 64 + 8x^2 + 32x = \\ &= 9x^2 + 48x + 64 = (3x+8)^2 \\ y &= \frac{x+8 \pm |3x+8|}{4} \end{aligned}$$

О.П.3

$$\begin{cases} y > 0 \\ -xy > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 0 \\ x < 0 \end{cases}$$

Вальнейшее решение
на О.П.3

$$\begin{cases} y = x+4 \\ y = -\frac{x}{2} \end{cases}$$

Преобразуем ур-е I

$$\left(\frac{x^4}{y^2}\right)^{\lg y} = (-x)^{\lg(-xy)} = (-x)^{\lg(-x)} \cdot (-x)^{\lg y}$$

$$\left(\frac{-x^3}{y^2}\right)^{\lg y} = (-x)^{\lg(-x)}$$

$$\text{при } y = -\frac{x}{2} \Rightarrow \text{т.к. } x = -2y$$

$$\left(\frac{8y^3}{y^2}\right)^{\lg y} = 2y^{\lg 2y} \Rightarrow \left(\frac{8y}{y^2}\right)^{\lg y} = (2y)^{\lg y} \cdot (2y)^{\lg 2}$$

$$4^{\lg y} = 2y^{\lg 2}$$

след.
сфр.

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Заметим, что обе функции всё время возрастают, ~~возраст~~ возрастают без "изгибов" (монотонно). Значит они имеют не более одной точки пересечения. Подставим $y=2$

$$4 \lg^2 = 4 \lg^2 \Rightarrow \text{рав-во выполняется}$$

на

$$x = -2y = -4$$

$$x = -4; y = 2 \text{ в осев}$$

при $x=y$ $y = x + 4 \Rightarrow x = 4 - y, y < 4$ (в шпу) (ос)

$$\left(\frac{(4-y)^3}{y^2}\right) \lg y = (4-y) \lg(4-y)$$

$$(4-y) \lg y^3 - \lg(4-y) = y \lg y^2$$


$$(4-y) \lg\left(\frac{y^3}{4-y}\right) = y \lg y^2$$

Оценив производные можно так же показать, что решений ≤ 1

$$y=2; 2 \lg^4 = 2 \lg^4 \Rightarrow x = -2; y=2 \text{ в осев}$$

Ответ: $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \\ x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$

Задача 4



заметьте, что ~~ура~~
нуре

Обозначим пирамиды, образо-
ванные углом S и плоскостями
 α и β , P_α и P_β соответственно

P_α подобна P_β , т.к. они имеют
общий угол и параллельные
основания.

Пусть коэффициент подобия = k

Тогда, площадь основания P_β и площади
основания P_α относятся как k^2

$$k^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow k = \frac{3}{2}$$

пусть высота $P_\alpha = h$, тогда высота $P_\beta = \frac{3}{2}h$

Тогда диаметр сферы $D = \frac{h}{2}$, а радиус

$$R = \frac{D}{2} = \frac{h}{4} \Rightarrow SO = \frac{5h}{4}; KO = \frac{h}{4}$$

$\angle OKS = 90^\circ$, т.к. $(\cdot)K$ - точка касания

пусть $\angle KSO = \alpha$

$$\text{тогда } \sin \alpha = \frac{KO}{SO} = \frac{1}{5}$$

$$\angle KSO = \arcsin\left(\frac{1}{5}\right)$$

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Задача 5

$$I \quad |x-6-y| + |x-6+y| = 12$$

$$II \quad (|x-6|)^2 + (|y-8|)^2 = a$$

Возведем ур-е I в квадрат

$$(x-6-y)^2 - 2y(x-6) + y^2 + (x-6+y)^2 + 2(x-6)y + y^2 = 144$$

$$(x-6)^2 + y^2 = 72 - \text{окружность с центром в точке } (6; 0) \text{ и } r = 6\sqrt{2}$$

при всех x и y — окр. с $r = 6a$, размещается положение центра

II при $x \geq 0, y \geq 0$

окружность центр — $(6; 8)$

при $x < 0, y \geq 0$ центр — $(-6; 8)$

при $x \geq 0, y < 0$ центр — $(6; -8)$

при $x < 0, y < 0$ центр — $(-6; -8)$

* графики со примерно схематично нарисованными осями находятся на след. странице

Случай 1 — $\sqrt{a} < 6\sqrt{2} - 6$ — нет решений (точек пересечения)


Случай 2 — $\sqrt{a} = 6\sqrt{2} - 6$ — 2 точки пересечения, $\Rightarrow$ в осв.

Случай 3 — $6\sqrt{2} - 6 < \sqrt{a} < 2\sqrt{5}$

Стык двух окр-ей в точках A_1 и A_2 достигается

$$\text{при } (0-6)^2 + (6-8)^2 = a \Rightarrow a = 40 \Rightarrow \sqrt{a} = 2\sqrt{5}$$

Случай 3 — $6\sqrt{2} - 6 < \sqrt{a} \leq 2\sqrt{5}$ — 4 точки пересечения
и. след.
сер.



При дальнейшем увеличении a "стыки" будут выше A_1 и ниже A_2 для соответствующих стыков.

Стык "стык" добдет до $(\cdot) B$ при $(6\sqrt{2} + 6 - 6)^2 + (0 - 8)^2 =$
 $= a = 136 \Rightarrow \Gamma a = \underline{2\sqrt{34}}$

Случай 4 - $2\sqrt{5} < \Gamma a < 2\sqrt{34}$ - 2 решения

Случай 5 - $\Gamma a = 2\sqrt{34} \Rightarrow 1$ решение (точка B)




Случай 6 - $\Gamma a > 2\sqrt{34}$ - нет решений

Подходит $\Gamma a = 6\sqrt{2} - 6$ и $2\sqrt{5} < \Gamma a < 2\sqrt{34}$

$$a = 108 - 72\sqrt{2} \text{ и } 40 < a < 136$$

Ответ: $\{108 - 72\sqrt{2}\} \cup (40, 136)$

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА



$$\frac{3}{2}h$$

$$\Rightarrow D = \frac{h}{2}$$

$$R = \frac{h}{4} \quad k \frac{sh}{4}$$

k

k^2

$$k^2 = \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\sin \alpha = \frac{\frac{h}{4}}{\frac{sh}{4}} = \frac{1}{5}$$

$$ab = \frac{1}{16}h^2$$

$$a + b = \frac{5h}{4}$$

$$a = \frac{5h}{4} - b$$

$$\frac{shb}{4} - b^2 = \frac{h^2}{16}$$

$$16b^2 - 20shb + h^2 = 0$$

$$\frac{D}{4} = 100h^2 - 16sh^2 = 84h^2$$

$$hb = \frac{10h \pm 2\sqrt{21}h}{16} = \frac{sh \pm \sqrt{21}h}{8}$$

$$(x-6)^2 + y^2 = 72$$




$$(|x|-6)^2 + (|y|-8)^2 = a$$

$$6\sqrt{2}$$


$$a = 40$$

$$R = \sqrt{40} =$$

$$= 2\sqrt{5}$$



ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА



$$\int y > 3^x + 4 = 3^{81}$$

$$\int y < 85 + (3^{81} - 1) \cdot x$$

$$y = 3^x + 4 \cdot 3^{81}$$

$$y = 85 + (3^{81} - 1)x$$

$$y - 4 < 0$$

$$x = 4 - y \quad y \in (0; 4)$$

$$\left(\frac{(u-y)^3}{y^2} \right)^{\log y} = (u-y)^{\log(y-y)}$$

$$\frac{y-4}{(y-4)^2} \log y - \log\left(\frac{y-4}{y}\right) = \frac{1}{y} \log y^2$$

$$(y-y) \lg \frac{y}{y} = y \lg y^2$$

$$(4-y) \log \frac{y}{4-y}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{4}y - y^2\right)' &= \frac{3y^2}{4} - 2y = 0 \\ y\left(\frac{3}{4}y - 2\right) &= 0 \\ y\left(y - \frac{8}{3}\right) &= 0 \end{aligned}$$

$$\sqrt{2} (1 - 2 \sin^2 5x) \quad \frac{\pi}{4}$$

$$2 \cos 5x \cos 2x - 2 \sin 5x \cos 2x = \\ = \sqrt{2} \sin 10x$$

$$2 \cos(5x + \frac{\pi}{4}) \cos 2x = \cos 10x$$

$$\cos(3x + \frac{\pi}{4}) + \cos(7x + \frac{\pi}{4}) = \cos 10x$$

$$\cos(3x + \frac{\pi}{4}) = 2 \sin(\frac{17x + \pi}{8}) \sin(\frac{3x - \pi}{8})$$

$$2 \cos(5x + \frac{\pi}{4}) \cos 2x =$$

$$\cos x$$

$$= \cos(5x + \frac{\pi}{4}) \cos(5x - \frac{\pi}{4}) -$$

$$\sqrt{2} \cos 2x (\cos 5x - \sin 5x) = (\cos 5x - \sin 5x) + \sin(5x + \frac{\pi}{4}) \sin(5x - \frac{\pi}{4}) \\ (\cos 5x + \sin 5x)$$

$$(\cos 5x - \sin 5x)(\sqrt{2} \cos 2x - (\cos 5x + \sin 5x)) = 0$$

$$\uparrow \\ \sqrt{2} \cos(5x - \frac{\pi}{4})$$

$$\cos(5x + \frac{\pi}{4}) (\cos 2x - \cos(5x - \frac{\pi}{4})) = 0$$

$$\begin{cases} 5x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{2} \\ 2x = 5x - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \\ 2x = \frac{\pi}{4} - 5x + \frac{\pi k}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{20} + \frac{\pi k}{10} \\ x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{3} \\ x = \frac{\pi}{28} + \frac{\pi k}{7} \end{cases}$$

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

$$\begin{cases} \left(\frac{x^4}{y^2}\right) \lg y - (-x) \lg(-xy) \\ 2y^2 - xy - x^2 - 4x - 8y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y > 0 \\ -xy > 0 \\ x < 0 \end{cases}$$

$$2y^2 - xy - x^2 - 4x - 8y = 0$$

$$y^2 - x^2 + y^2 - xy - 4x - 8y = 0$$

$$2y^2 - y(x+8) - (x^2+4x) = 0$$

$$0 = x^2 + 16x + 64 + 8x^2 + 32x =$$

$$= 9x^2 + 48x + 64 = (3x+8)^2$$

при $x < -\frac{8}{3}$

$$\begin{cases} y = x+4 \\ y = -\frac{x}{2} \end{cases}$$

$$y = \frac{x+8 \pm (3x+8)}{4}$$

$$\lg \lg a^b = \lg \lg a^b = (\lg a)^b \lg a$$

$$y > 0$$

$$-x$$

$$x > -4$$

$$x < 0$$

при $3x+8 \geq 0$

$$x \geq -\frac{8}{3}; x < 0$$

$$\lg a^b = b \lg a$$

$$\begin{cases} y = x+4 \\ y = -\frac{x}{2} \\ y > 0 \\ x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \frac{4x+16}{4} = x+4 \\ y = -\frac{x}{2} \end{cases}$$

при $y = -\frac{x}{2}$

$$(4x^2) \lg -\frac{x}{2} = (-x) \lg \frac{x^2}{2}$$

$$(-2x)$$

$$(-x) \lg(-x) + \lg y = (-x) \lg(-x) + (-x) \lg y$$

$$\begin{cases} y = x + 4 \\ y = -\frac{x}{2} \end{cases}$$

$$\log_{-x} 10$$

$$x^{\log x}$$

$$\log_b c = a$$

$$b^a = c$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$a^{\log_b a} =$$

$$= b^{\log_b a} = a$$

$$\left(\frac{x^4}{y^2}\right)^{\log y} = (-x)^{\log -x} \cdot \log(-x)^{\log y}$$

$$\left(-\frac{x^3}{y^2}\right)^{\log y} = (-x)^{\log -x}$$

$$\text{при } y = -\frac{x}{2} \quad x = -2y$$

$$(8y)^{\log y} = (2y)^{\log y} + \log 2 = (2y)^{\log y} \cdot (2y)^{\log 2}$$

$$\frac{1}{y} 4^{\log y} = 2y^{\log 2}$$

$$y = 2 \Rightarrow x = -4$$

$$\left(\frac{2^8}{2^2}\right)^{\log 2} = 2^2 \log 2^3$$

$$-x = -y + 4$$

$$\left(\frac{(4-y)^3}{y^2}\right)^{\log y} = (4-y)^{\log(4-y)}$$

$$y < 4$$

$$\text{при } y \neq 4$$


$$|x - b - y| + |x - b + y| = 12$$

$$\text{при } x - b > y$$

$$(x-b)^2 - 2(x-b)y + y^2 + (x-b)^2 + 2y(x-b) + y^2 = 144$$

$$(x-b)^2 + y^2 = 72 \Rightarrow r = 6\sqrt{2}$$

$$\text{при } |a| = 6\sqrt{2} - 8$$



ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

$$\begin{array}{r} 16875 \overline{) 15} \\ - 15 \\ \hline 18 \\ - 15 \\ \hline 37 \\ - 35 \\ \hline 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3375 \overline{) 15} \\ - 30 \\ \hline 37 \\ - 35 \\ \hline 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 675 \overline{) 15} \\ - 15 \\ \hline 17 \\ - 15 \\ \hline 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 135 \overline{) 15} \\ - 10 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\cos a + \cos b = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos \frac{a+b}{2} \cdot \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\cos \left(\frac{a+b+a-b}{2} \right) + \cos \left(\frac{a-b+a+b}{2} \right)$$

$$\begin{array}{r} 3 \cdot 5^4 \\ \times 625 \\ 27 \\ \hline 4375 \\ + 1250 \\ \hline 16875 \end{array}$$

$$\text{либо } 1 \cdot 3 \cdot 5^4$$

$$\text{либо } 1 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 5^4$$

$$\frac{8!}{4!3!} + \frac{8!}{2!4!} =$$

$$= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{8 \cdot 7 \cdot 5 + 8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3} =$$

$$= 8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 4 =$$

$$= 56 \cdot 20 = \underline{\underline{1120}}$$

$$\cos a - \sin a = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos a - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin a \right) = \sqrt{2} \cos \left(a + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\sqrt{2} \cos \left(7x + \frac{\pi}{4} \right) - \sqrt{2} \cos(10x) + \sqrt{2} \cos \left(3x + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos(10x)$$

$$2 \cos \left(\frac{10x + \frac{\pi}{4}}{2} \right) \cos \left(\frac{4x}{2} \right) = \cos 10x$$

$$2 \cos \left(5x + \frac{\pi}{4} \right) \cos 2x = \cos 10x$$

$$\sqrt{2} \cos 10x = \cos \sqrt{2} \cos 3x \cos 7x - \sqrt{2} \sin 3x \sin 7x$$

~~cos 7x~~

$$A + \sqrt{2}AB + B = A + \frac{\sqrt{2}}{2}AB + \sqrt{2}B + \frac{\sqrt{2}}{2}AB$$

$$\cos 7x + \cos 3x = 2 \cos 5x \cos 2x$$

$$\sin 7x + \sin 3x = 2 \sin 5x \cos 2x$$

$$\cos 10x = \cos 2x \cos 5x + \sin 5x \sin 2x$$

$$2 \cos 5x \cos 2x - \sqrt{2} \cos 10x = 2 \sin 5x \cos 2x$$

$$\sqrt{2} \cos^2 5x \neq \sqrt{2}$$

$$2 \cos 5x \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 5x = 2 \sin 5x \cos 2x - \sqrt{2} \sin^2 5x$$

$$\sqrt{2} \cos 5x (\sqrt{2} \cos 2x - \cos 5x) = \sin 5x (\sqrt{2} \cos 2x - \sin 5x)$$

$$2 \cos(5x + \frac{\pi}{4}) \cos 2x = \cos 10x$$

$$\sqrt{2} \cos \alpha + \sqrt{2} \sin \alpha = \sqrt{2} \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \sqrt{2} \cos \alpha = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{2} \cos 10x = \cos(10x - \frac{\pi}{4}) - \sin(10x - \frac{\pi}{4})$$

$$\sqrt{2} \cdot 2 \cos(5x + \frac{\pi}{4}) \cos 2x = \cos 10x$$

$$\cos 5x \cos(5x - \frac{\pi}{4}) -$$

$$\cos(a - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2} \cos a + \sqrt{2} \sin a}{2}$$

$$- \sin 5x$$

$$\cos a - \sin a = \sqrt{2} \cos(a + \frac{\pi}{4})$$

$$2 \cos 2x (\cos 5x - \sin 5x) = \sqrt{2} \cos 10x = \cos(5x - \frac{\pi}{4}) - \sin(5x - \frac{\pi}{4})$$

$$\sqrt{2} \sqrt{2} \cos 2x \cos(5x + \frac{\pi}{4}) = \cos(5x - \frac{\pi}{4}) - \sin(5x - \frac{\pi}{4})$$

$$\cos(a - \frac{\pi}{2}) = \sin a$$



$$\cos(a + \frac{\pi}{2}) = -\sin a$$

$$-\sin(5x - \frac{\pi}{4}) = \cos(5x + \frac{\pi}{4})$$

$$\cos 5x - \sin 5x = \cos 5x - \sin 5x$$

$$-2\sqrt{2} \cos 2x \sin(5x - \frac{\pi}{4}) + \cos \sin(5x - \frac{\pi}{4})$$